

*Cuadernos
de
Investigación
Biológica*

**RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS EN
EL IX CONGRESO NACIONAL DE MALACOLOGIA**

**IX. MALAKOLOGIAZKO KONGRESU NAZIONALEAN
AURKEZTURIKO KOMUNIKAZIOEN LABURPENAK**

BILBAO, 17-20 DICIEMBRE 1992
BILBO, 1992. eko ABENDUAK, 17-20.

Volumen N.º 17 - Diciembre 1992

CIB



CUADERNOS DE INVESTIGACION BIOLOGICA

Director: Jesús Moya
Secretario: Eduardo Angulo
Consejo de Redacción: Eduardo Angulo
J. C. Iturrondobeitia
Jesús Moya
Ana Rallo
J. I. Sáiz Salinas

Laboratorio de Citología e Histología
Facultad de Ciencias
Universidad del País Vasco
Apartado 644, 48080 Bilbao

Imprime: Imprenta BOAN, S.A.
Padre Larramendi, 2
48012 BILBAO
Dep. Legal: BI-717-89
ISSN-0211-5700

IX CONGRESO NACIONAL
DE MALACOLOGIA
Taxonomía/Biogeografía
Taxonomia/Biogeografia



IX. MALAKOLOGIAZKO
KONGRESU NAZIONALA
P51

CONTRIBUCION A LA MALACOLOGIA DE LA SIERRA DE ESPADAN
(CASTELLON).

J. ALBESA*, A. MARTINEZ-ORTI** y F. ROBLES*

*Area de Paleontología. **Area de Biología Animal. Fac. de Biología. Univ. de València. 46100 Burjassot (València).

La Sierra de Espadán ocupa el área meridional de la Provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Su litología es predominantemente silíceo, aunque localmente aparecen importantes masas calizas muy carstificadas. Los muestreos realizados por los autores han permitido incrementar los datos sobre varias especies de Gasterópodos terrestres poco conocidos en la Comunidad Valenciana.

El material recolectado en la Cova del Gat, en Ahín (30SYK2820) ha permitido corregir determinaciones anteriores de dos especies troglóbicas, *Oestophora hispanica* (Gude) y *Gomphroa boysii* (Dupuy), que corresponden en realidad, en opinión de los autores, a *Suboestophora tarraconensis* (Altimira) e *Hypnophila malagana* Gittenberger.

S. tarraconensis sólo era conocida, en la Comunidad Valenciana, del Desierto de las Palmas (31SBE44). El hallazgo de ejemplares vivos o de conchas entre Artesa y Onda (30SYK3227), Eslida (30SYK3017) y Fondegulla (30SYK3313) amplía considerablemente su área de extensión. Destaca el hecho de la aparición de esta especie sobre substratos silíceos en varias localidades, en las que la disponibilidad de carbonatos es muy escasa.

Por lo que se refiere a *H. malagana*, la localidad de Ahín representa la tercera cita para la Comunidad Valenciana, intermedia entre Porta Coeli (Valencia) y Serra d'Engarceran (Castellón), donde había sido citada previamente por Escolà y Bech (1986, *Misc. Zool.*, 10: 89).